

Die Revision nach Resektion - machbar und erfolgreich?



Dr. Maik Göbbels - Hoyerswerda

Parodontitis apicalis

Ursachen

- bakterielle Infektion des WK- systems (z.B. Karies, Trauma, coronales Leakage, unvollständige WF)
- bakterielle Infektion über parodontale Tasche
- chemische Entzündungsfaktoren (z.B. WF- Material bzw. medikamentöse Einlage)

Therapie (Keimreduktion bzw. Ausschluss der ursächlichen Noxe)

- Wurzelkanalbehandlung
- Revision einer vorhandenen Wurzelfüllung
- Wurzelspitzenresektion / apikale Kürettage
- Parodontitistherapie



Die Revision nach Resektion - machbar und erfolgreich?



Ursachen für den Misserfolg einer WSR

(nach Saunders)

- persistierende mikrobielle Kontamination des WK- systems oder Rekontamination über koronale Undichtigkeiten (Coronal Leakage)
- anatomische Probleme und Anomalien (z.B. Isthmen)
- nicht aufgefundene und nicht behandelte Wurzelkanäle
- Mikrofrakturen, -risse auf der Resektionsfläche
- undichter apikaler Verschluss
- extraradikuläre Infektion (Histologie?)
- fehlerhafte chirurgische Technik

